


Brachythecium rutabulum	Brachythecium curtum (= B. oedipodium)	Rhynchosstegium megapolitanum
Stammlätter	Stammlätter	Stammlätter
		
<ul style="list-style-type: none"> • relativ kurz zugespitzt • faltig • Rippe 2/3 der Blattlänge • knapp über dem Grund am breitesten • nicht oder nur kurz herablaufend • Rhizoiden am Grunde der Rippe meist fehlend • Blätter am Grunde kaum verengt 	<ul style="list-style-type: none"> • Relativ lang zugespitzt • Nicht oder schwach faltig • Rippe bis etwa zur Mitte oder etwas darüber • knapp über dem Grund am breitesten • lang herablaufend • Rhizoiden am Grunde der Rippe meist fehlend • Blätter am Grunde etwas verengt 	<ul style="list-style-type: none"> • lang zugespitzt • nicht faltig • deutlich über dem Grund am breitesten • nicht oder nur kurz herablaufend • Rhizoiden am Grunde der Rippe oft vorhanden, vor allem an älteren Stängelstücken • Blätter am Grunde stark verengt



- Blattflügelzellen auf die Zellecken beschränkt
- Höchstens 1-2 Reihen breiterer Zellen am Grunde
- Zellen des Blattgrundes deutlich getüpfelt

- Blattflügelzellen auf die Zellecken beschränkt
- Höchstens 1-2 Reihen breiterer Zellen am Grunde
- Zellen des Blattgrundes schwach getüpfelt

- „Blattflügelzellen“ ziehen sich bis zur Rippe hin
- Mehrere Reihen breiterer Zellen am Grunde
- Zellen des Blattgrundes schwach getüpfelt

Geruch

- Muffig, erdig

Geruch

- Muffig, erdig

Geruch

- Schwach nach Gurke riechend

Astblätter

- Rippe nicht als Dorn austretend

Astblätter

- Rippe oft als Dorn austretend

Astblätter

- Rippe nicht als Dorn austretend