

Anmerkungen zur aktuellen Verbreitung von *Ramalina calicaris* in Deutschland

Volkmar WIRTH

Zusammenfassung: WIRTH, V. 2011. Anmerkungen zur aktuellen Verbreitung von *Ramalina calicaris* in Deutschland. – Herzogia 24: 367–369.

Ramalina calicaris ist in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren Regionen im Südwesten Deutschlands gefunden worden. Offensichtlich war die Art dort schon seit jeher Teil der Flechtenbiota. Sie war bis in die 1950er Jahre von mehreren Lichenologen korrekt angegeben worden, wurde aber später übersehen bzw. falsch interpretiert. 1999 wurde sie unter dem richtigen Namen in der Schwäbischen Alb wieder nachgewiesen.

Abstract: WIRTH, V. 2011. Notes on the recent distribution of *Ramalina calicaris* in Germany. – Herzogia 24: 367–369.

During the past decades, *Ramalina calicaris* was found in several areas in south-western Germany. In this region, the species was apparently continuously part of the lichen biota. The species had been correctly reported from south-western Germany until the 1950s, but was overlooked or misinterpreted afterwards. In 1999, *R. calicaris* was rediscovered under its correct name in the Suabian Alb.

Key words: Epiphytes, distribution, threatened lichens.