

Notes on the genus *Usnea* (lichenized Ascomycota, Parmeliaceae) IV

Philippe CLERC

Abstract: CLERC, P. 2016. Notes on the genus *Usnea* (lichenized Ascomycota, Parmeliaceae) IV. – *Herzogia* 29: 403–411.

Several species of the genus *Usnea* occurring supra-continentially are treated. *Usnea barbata* is new to the United Kingdom. *Usnea entoviolata* is new to Europe and a map of its known worldwide occurrence is given. *Usnea perhispidella* (syn. nov: *U. eumitrioides*), *U. poliotrix*, and *U. subdasaea* are new to North America. *Usnea perplexans*, a Himalayan taxon, is the correct name for *U. lapponica*, a widely occurring species in Europe and North America. *Usnea aciculifera*, *U. hondoensis* and *U. pangiana* are also discussed.

Zusammenfassung: CLERC, P. 2016. Anmerkungen zur Gattung *Usnea* (lichenisierte Ascomyceten, Parmeliaceae) IV. – *Herzogia* 29: 403–411.

Einige Arten der Gattung *Usnea* mit zum Teil über mehrere Kontinente hinweggehender Verbreitung werden behandelt. *Usnea barbata* ist neu für die Britischen Inseln, *Usnea entoviolata* ist neu für Europa. *Usnea perhispidella* (Syn. nov: *U. eumitrioides*), *U. poliotrix* und *U. subdasaea* sind neu für Nordamerika. *Usnea perplexans*, aus dem Himalaya beschrieben, ist der gültige Name für *U. lapponica*, eine weit verbreitete Art aus Europa und Nordamerika. *Usnea aciculifera*, *U. hondoensis* und *U. pangiana* werden diskutiert.

Key words: Systematics, taxonomy, lichens.